

Untersuchungen über die Ursachen der Bißverschiebungen.

Hellmuth Grunert.

Untersuchungen über die Ursachen der Bißverschiebungen.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der Zahnheilkunde
verfaßt und einer Hohen Medizinischen Fakultät der
Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Hellmuth Grunert,
prakt. Zahnarzt, Markt Grafing (Oby.).

München 1933.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Bißverschiebungen, die wir im menschlichen Gebisse antreffen, zeigen im allgemeinen ein so vielgestaltiges Bild, mit so wechselnden und bunten Formen und Uebergängen, daß eine gewisse einheitliche und klare anatomische Systematik fast unmöglich erscheint. In der Tat geht hier auch fast jeder Forscher andere Wege. Und doch ist es unbedingt notwendig, daß man vor der Untersuchung der Ursachen dieser eigenartigen Anomalien erst ein Bild über die Einteilung der Formen festzuhalten hat.

Es hat nicht an Forschern gefehlt, die der Systematik der Formen wenig Bedeutung beimessen, da sie die Bißverschiebungen als die Resultate wohldurchdachter Pläne der Natur betrachten, so Frank in Cleveland. In der Tat ist bei den Bißverschiebungen anatomisch und physiologisch ein gewisses kompensatorisches Ausgleichbestreben der Natur unverkennbar. Es ist mir aber unerklärlich, wie man die Ursachen dieser auszugleichenden Anomalien festlegen und — was die Hauptsache ist — therapeutisch bekämpfen soll, ohne die Formen derselben systematisch zuerst zu sichten. Am klarsten ist dies wohl Euler gelungen, der die äußerlichen Formen der Anomalien folgendermaßen einteilt:

„I. Abweichung in sagittaler oder mesio-distaler Richtung:

- a) Der Unterkiefer steht gegen den Oberkiefer zurück, das Kinn weicht zurück — Prognathie.
- b) Der Unterkiefer steht gegen den Oberkiefer vor, die unteren Zähne beißen vor die oberen, Unterlippe und Kinn stehen vor — Progenie.
- c) Die Zähne des Ober- und Unterkiefers treffen senkrecht aufeinander — Kopfbiß.

II. Abweichung in vertikaler Richtung:

- a) Die Zahnreihen artikulieren in ihrem hinteren Abschnitte normal, weichen aber von den Prämolaren oder Molaren ab so auseinander, daß eine Artikulation überhaupt nicht zustande kommt — offener Biß.

- b) Die hinteren Zähne artikulieren normal, die Frontzähne greifen aber weit übereinander, daß die Schneidekanten oft den Zahnfleischrand berühren — tiefer Biß.

III. Abweichung in frontaler Richtung:

Der Unterkiefer ist seitlich gegen den Oberkiefer verschoben. Es findet meist in der Mittellinie der beiden Zahnreihen eine Kreuzung statt — Kreuzbiß.“

Es ist ohne Zweifel möglich, in dieser klaren, scharf umrissenen Einteilung die mannigfachen Formen der Bißanomalien unterzubringen. Gleichwohl werden wir in vielen Fällen Uebergangsformen finden, was sich nur dadurch erklären läßt, daß eben nicht jede der einzelnen Abschnitts- und Unterabschnittsformen auf einer ganz bestimmten, spezifischen Ursache beruht. Wie immer in der Biologie und im pathologischen Geschehen wirken eben meist eine ganze Reihe von Ursachen ein, um das jeweils vorliegende Bild zu formen.

Es ist nun sicher sehr schwierig, diese Fälle von Ursachen einheitlich in Gruppen zusammenzufassen. Wir finden auch in der Tat fast bei jedem Forscher eine andere Einteilung.

Meiner Ansicht nach lassen sich die Ursachen der Bißanomalien übersichtlich und erschöpfend auf folgende Gruppen zurückführen:

- I. Bißanomalien, deren Anlage von vornherein auf den Lebensweg mitgegeben wird, also Vererbung, intrauterine Schädigungen und embryonale Anlagen.
- II. Bißanomalien, die während des extrauterinen Lebens erworben werden und zwar
 - A) auf Grund von Krankheitsgeschehen oder pathologischen Verhältnissen,
 - B) auf Grund äußerer, mehr mechanischer Einflüsse, die
 - a) entweder unmittelbar auf die Kiefer und Zähne einwirken, oder
 - b) durch Störungen im Auf- oder Abbau des Zahnsystems.

Selbstverständlich können — wie schon erwähnt — diese Ursachen in bunter Anordnung zusammenwirken, wobei bald die eine, bald die andere Gruppe überwiegt. So können zum Bei-

spiel die pathologischen Verhältnisse bereits im embryonalen Leben begründet und veranlagt sein.

Wenden wir uns nun zur ersten ätiologischen Gruppe der Bißanomalien.

Daß die Vererbung bei Stellung und Gestalt sowohl der einzelnen Zähne wie der Kiefer und damit der Bißverschiebungen eine große Rolle spielt, war der menschlichen Beobachtung schon seit Jahrhunderten bekannt. Konnte man doch durch Jahrhunderte die bekannten Biß-Familieneigentümlichkeiten bedeutender Geschlechter in Bild und Plastik verfolgen, so z. B. die Progenie der Habsburger, die sogenannte Habsburger Lippe. Erst später wurden die Vererbungserscheinungen wissenschaftlich und experimentell erfaßt, so in Amerika von Case, in Deutschland von Pfaff und Kadner, die alle mit Eifer die Vererbungstheorie verfechten. Es hat natürlich nicht an Gegnern gefehlt und in den letzten Jahren hat besonders Kantorowicz vor einer Ueberschätzung der Vererbung gewarnt. Er hat sogar nachgewiesen, daß bei der Habsburger Lippe nicht eine Vererbung der echten Klasse III vorlag, sondern bei Neutralbiß der Molaren ein durch Fehlen der oberen seitlichen Schneidezähne bedingter oberer Schneidezahnrückstand, der äußerlich das Bild der echten Progenie vortäuschte. Allerdings nimmt er das Fehlen dieser seitlichen Schneidezähne als eine Vererbung an.

Damit scheint mir die obige Erwägung wertlos, denn das Prinzip der Vererbung als solches wird ja nicht bestritten. Daß „die Vererbungsverhältnisse nicht so einfach liegen“, darin hat Kantorowicz sicher recht, darauf deutet auch der bis heute nicht verstummende Streit in der Literatur hin. Wenn aber Kantorowicz schreibt, daß nicht seltene Uebereinstimmung der Kieferanomalien innerhalb einer Familie kein Beweis für wirkliche Vererbung ist, sondern das notwendige Ergebnis der Einwirkung gleicher mechanischer Einflüsse als Folge gleicher Umweltsbedingungen, so kann ich ihm hier auf Grund meiner zahlreichen Untersuchungen in der Praxis unmöglich beistimmen.

Gerade bei meinen Landpatienten, wo es sich meist um ganz spezifische und leicht wieder zu erkennende anatomische Zahn-

und Kieferformen handelt, habe ich unzähligemale festgestellt, daß bei den Kindern dieselben Abweichungen in Zähnen und Kiefern vorkamen, wie bei den Eltern und Großeltern. Ich konnte dabei beobachten, wie bei einem Kinde das Erbgut des einen oder des anderen Elternteils oder ein Mischverhältnis zu Tage tritt. Oder es hatte ein Teil der Kinder die Bißanomalie, ein anderer die normalen Verhältnisse geerbt.

Einen besonders treffenden Fall hiefür möchte ich aus meiner Praxis anführen: Nämlich Familie I. Der Vater hat Progenie, die Mutter normale Okklusion. Der ältere Sohn hat bereits schon, obwohl sonst selten beobachtet, im Milchgebiß eine Progenie, der jüngere dagegen den Biß der Mutter. Schon äußerlich gleichen die beiden Söhne den betreffenden Eltern.

Noch interessanter dürfte wohl der Fall der Familie II sein: Mutter und Tochter haben Progenie, aber diese ist noch mit einem



Abbildung 1.

Klaffen der Molaren und Prämolaren verbunden. Leider ist das Artikulationsgleichgewicht bereits gestört, aber nach ihren verlässigen Angaben — da dieser Biß schon seit Kindheit der Patientin eine Sorge war — ist ihrem Bericht Glauben zu schenken (Abbildung 1).

Auch Ueberspringen ganzer Generationen läßt sich nachweisen, nämlich wenn beim Enkel oder Urenkel plötzlich eine Bißanomalie des Ahnen wieder auftritt.

Wenn ich oben das Mischverhältnis im Erbgut erwähnte, so tritt es meist in der Weise auf, daß ein Kind von einem Elternteil die Erbschaft der Zähne (meist große), vom andern die der Kiefer (meist kleine) antritt. Die Folge ist natürlich Platzmangel und sekundär eine Bißanomalie. Gewiß gleicht die Natur auch hier insofern bis zu einem gewissen Grade aus, als bekanntlich die Zähne die Gestaltung des Kiefers bedingen. Es werden also große Zähne sehr wohl auch den Alveolarfortsatz zwangsläufig zu größerem Wachstum reizen. Tritt aber hier eine gewisse Wachstumschwäche hemmend entgegen, so erscheinen unausbleiblich als Folge des Kampfes um den Raum die Bißanomalien.

Abgesehen von der Vererbung ist das embryonale Leben hinsichtlich Bißverschiebungen sicher mitbestimmend, wenn auch diese Ätiologie gegenüber den später erworbenen zweifelsohne stark zurücktritt. Und zwar kann sich diese Mitbestimmung auf mechanische Ursachen oder auf Veranlagung beziehen. Auf Grund mechanischer Schädigungen glaubt besonders Weinberger intrauterin bedingte Kieferanomalien feststellen zu können. Er begründet dies durch die stark gekrümmte Lage des Embryos, die besonders die Mundregion dem Herzwulst anpreßt. Bleibt nun das Amnion durch Fruchtwassermangel zu klein, so unterbleibt eine Aufrichtung des Embryos und der abnorme Druck bedingt direkt mechanische Deformationen (Distalverlagerung des Unterkiefers) und durch Zirkulationsstörung Wachstumshemmungen.

Verschiedene Forscher, so in Deutschland Groth, haben diese Hypothese angenommen und ausgebaut. Ich sage Hypothese, denn der Beweis scheint mir trotz des Bestehenden noch nicht geliefert. Und schließlich kann ich nicht einsehen, warum sich eine so erworbene mechanische Anomalie nicht im späteren Leben ausgleichen sollte, wenn die Zähne „platzfordernd“ — wie Kantorowicz treffend sagt — die Gestalt des Kiefers beeinflussen.

Daß Geburtstraumen eine bleibende Ursache für Bißanomalien spielen, glaube ich bei der vitalen Kraft des kindlichen Gewebes nicht. Wie oft sah ich Bauernkinder mit schweren Narben von Zangengeburt und doch ganz normalen Bißverhältnissen.

Eine weit größere Rolle spielt sicher die Anlage des im Uterus sich entwickelnden Kindskörpers. So können nach Pierre Robin angeborene Verengerungen der Kiefer infolge von Intoxikationen auftreten, namentlich im Oberkiefer.

Auch Anomalien in der Veranlagung der Zahnleisten, z. B. Verlagerung der Leisten, der bleibenden Zähne vor der der Milchzähne, können bestimmend für die Bißverhältnisse des ganzen Lebens werden.

Nicht zuletzt sei hier der unerforschten Launen der Natur gedacht, in der Anlage der Zahnkeime nach Zahl und Stellung von der Norm abzuweichen. Es ist klar, daß daraufhin eine Über- oder Unterzahl oder abnormer Durchbruchplatz einzelner Zähne störend auf die späteren Bißverhältnisse eingreifen.

Wenn ich bereits oben schon von Wachstumsstörungen sprach, so möchte ich noch einmal darauf zurückkommen, und zwar nicht — wie oben — auf die intrauterinen, sondern auf die extrauterinen. Der Schädel erfährt in seiner Entwicklung die größten Veränderungen. Der Grund hiefür ist in der Tatfache zu suchen, daß der Schädel zwei anatomisch und physiologisch grundverschiedene Abschnitte vereinigt, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten sich entwickeln, nämlich den Gehirnschädel und den Gesichtschädel. Der erstere entwickelt sich in der Hauptsache intrauterin, während letzterer nach der Geburt erst seine Wachstumskraft entfaltet, die zum größten Teil von der Entwicklung des Kauapparates abhängt.

Auch die Funktion der Kiefer ist hier von Bedeutung. Sie soll schon sehr frühzeitig einsetzen; Bluntshli behauptet, schon während der Foetalperiode.

Die Wachstumsstörungen in der Zeit außerhalb des Mutterleibes können aber trotzdem in ganz frühe Zeiten ihres Foetallebens zurückreichen, obwohl sie sich erst später bemerkbar machen. So kann z. B. auf Grund der Vorverlagerung des Unterkiefers zwar eine Progenie gegeben sein; damit ist aber noch nicht gesagt, daß es bei dieser nicht auch Abweichungen geben kann. Oft finden wir Progenien in der Art, daß die unteren Schneidezähne so weit sagittal vor die oberen beißen, also ein Abbeißen nicht

möglich ist. Ich hatte einmal Gelegenheit, einen solchen Fall zu beobachten, leider fehlt mir aber die Möglichkeit, diesen an Hand von Abbildungen und Abdrücken genauer zu schildern. Bemühte sich auch der Patient noch so sehr, etwas abzubeißen, so war es ihm ein Uding.

In diesem Falle war die Anomalie darin begründet, daß der Oberkiefer sehr klein, der Unterkiefer aber sehr groß und weit ausladend war, besonders in die Länge. Auch äußerlich beim Anblick des Patienten fiel mir eine ungewöhnliche Größe der Hände und Füße im Vergleich zum übrigen Körperbau auf. Diese Abnormität der Progenie selbst führe ich auf Wachstumsstörung zurück und zwar in der Art, daß eine Mesialverlagerung des Unterkiefers in sagittaler Richtung gegen den Oberkiefer im Uterus stattgefunden hat. Wie sich nun später im Laufe der beiden Dentitionen die Kiefer entwickeln wollten, konnte es wohl der Unterkiefer, hemmte aber durch seinen Vorbiß den oberen am Wachstum in mesialer Richtung. Es kann sich sogar der Unterkiefer über normale Verhältnisse hinaus entwickelt haben, da er ja keine Hemmung hatte. Oder, was auch wahrscheinlich ist, der Oberkiefer kann auch in der Entwicklung zurückgeblieben sein.

Solche Wachstumsstörungen können in den meisten Fällen, gleich ob sie Unter- oder Oberkiefer treffen, oft die Ursache für Anomalien sein. Die bekannteste dürfte wohl das „Vogelgesicht“ sein, wo der Unterkiefer im Wachstum zurückblieb. In der Mehrzahl wirken sie sich aber so aus, daß eine Protrusion der oberen bzw. unteren Schneidezähne stattfindet.

Einen weiteren Fall von Wachstumsstörungen möchte ich noch anführen: Eine Patientin, die schon seit ihrer frühen Kindheit blutarm und schwächlich ist.



Abbildung 2.

Bei diesem Fall ist die Ursache aber in der Hauptfache darin zu suchen, daß nicht alle Zähne angelegt waren, bezw. zum Durchbruch kamen. Es wurden zwar nach Angabe der Patientin zwei Zähne extrahiert, doch ist dies schon in so früher Zeit geschehen, daß es nur Milchzähne gewesen sein können. Gebißschema:

$$\begin{array}{cccccccc|cccccc} 7 & 6 & 5 & 4 & 2 & 1 & / & 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 7 \\ \hline 7 & & & 4 & 3 & 2 & 1 & / & 1 & 2 & 3 & (5) & 7 \end{array}$$

Gerade das Fehlen der unteren Sechsjahr-Molaren ist ein schwerwiegendes Moment bei dieser Anomalie. Nicht so ausgeprägt hätte sich die Anomalie entwickeln können, hätten nur die seitlichen Schneidezähne gefehlt. Manche Autoren wollen bei solchen Fällen auch fehlenden Weisheitszähnen ein gut Teil Schuld beimessen, doch halte ich diese Ansicht für übertrieben, da doch schon die Entwicklung bei ihrem Durchbruch bereits abgeschlossen ist; gibt es doch eine Unmenge Gebisse, bei denen das Fehlen der Weisheitszähne keinerlei Anomalie verursacht hat. Ferner klaffen bei besagter Patientin alle Zähne bis auf:

$$\begin{array}{ccc|ccc} 7 & 1 & / & 1 & 7 \\ \hline 7 & 1 & / & 1 & 7 \end{array}$$

was wohl auf ein zu geringes Längenwachstum der Zähne bezw. deren Wurzeln zurückzuführen ist (Abbildung 2).

Zum Abschluß der ersten Gruppe von Ursachen der Bißanomalien sei gesagt, daß die Schwierigkeit der Forschung nach den Ursachen vor allem darin begründet sein dürfte, daß sich beide Kiefer auf Grund ihrer abnormen Funktion pathologisch entwickeln. Deshalb können wir, kommen uns Fälle mit vollentwickelter Anomalie zu Gesicht, bei den meisten nicht mit Sicherheit angeben, was der primäre Faktor gewesen ist.

Ein weit größeres und wichtigeres Gebiet der Ursachengruppen eröffnet sich im postembryonalen Leben und zwar zunächst auf Grund von Krankheitsgeschehen oder pathologischen Verhältnissen. Es sei hier aber ausdrücklich noch einmal betont, daß viele dieser erst postembryonal zutage tretenden Bißanomalien bereits in der Anlage des Foetus begründet sein können.

Dies gilt besonders von den hormonalen Störungen mit ihrem so unendlich großen Einfluß auf die menschlichen Organe.

Uns interessieren hierbei ganz besonders die Beziehungen der seit Starling — Hormone genannten Sekretionsprodukte der innersekretorischen Organe auf die der Mundhöhle. Das Interesse, hier überhaupt Beziehungen anzunehmen, war früher ein sehr geringes und es ist hauptsächlich den Forschungen Kranz's zu danken, daß auch hier die unlöslichen Beziehungen zwischen Zahnmedizin und allgemeiner Medizin ausgebaut wurden.

Vorweg sei betont, daß es sich bei allen auf Störungen der inneren Sekretion beruhenden pathologischen Verhältnissen nicht um Minder- oder Ueberproduktion irgend einer endokrinen Drüse handelt, sondern, wie Kranz sagt, „daß wir eine Gruppe von Wirkungen und Erscheinungen vor uns haben, deren Ursache dem polyglandulären System als Ganzem zuzuschreiben ist“.

Eine der wichtigsten Erscheinungen bei hormonalen Störungen ist der Kretinismus. Scholz fand hierbei in 32% aller Fälle Prognathie ausgeprägt. Dieses nach Virchow „tierschnauzenähnliche Aussehen“ wurde auch von Kranz festgestellt, dessen Untersuchung an zahlreichen Kretinenschädeln zu dem Ergebnis kam, daß die Zahn- und Kieferanomalien sehr häufig sind, „daß also klare, deutliche

Beziehungen zwischen Schilddrüse und Kieferbildung und Dentition bestehen“.

Aber auch die Beziehungen der Epithelkörperchen des Thymus, der Hypophyse und anderer Drüsen mit innerer Sekretion auf die Gestaltung der Zähne und Kiefer sind heute erwiesen. In den meisten Fällen dürfte die primäre Ursache hierfür in der Kalkstoffwechseltörung zu suchen sein.

Auf diese Tatsache baut Kranz den Uebergang von den hormonalen Störungen zu einer für die Bißanomalien so ungeheuer wichtigen Erkrankung, der Rachitis, deren Abhängigkeitsverhältnis vom endokrinen Drüsenystem eben im verhinderten Kalkaufbau zu suchen ist.

Jedenfalls ist diese verminderte Verkalkung und die dadurch bedingte Weichheit des Knochenystems das charakteristische Symptom dieser chronischen Wachstumskrankheit. Daß derartige pathologisch weiche Kieferknochen dem Muskelzug wenig Widerstand entgegensetzen, sondern ihm bis zu einem gewissen Grade folgen, ist ohne weiteres klar. So erhalten wir hauptsächlich beim Unterkiefer das typische eckige Bild, in dem der Kieferbogen von den Eckzähnen ab scharf abgewinkelt ist, während die Mitte der Frontlinie durch den *Musculus geniohyoideus* und *genioglossus* sogar etwas zungenwärts eingeknickt ist.

Der Oberkiefer ist oft verlängert und schnabelförmig verschmälert, wodurch oft der Gaumen hochgewölbt wird. Es entsteht damit die eigentümliche Kieferform der kontrahierten Kiefer.

Durch diese Deformation wären aber die schweren Bißanomalien bei Rachitis, die sich hauptsächlich im offenen Biß (*Mordex apertus*) dokumentieren, noch nicht restlos zu erklären. Hiefür sind hauptverantwortlich die schweren Strukturdefekte der Zähne selbst (*Hypoplasien*-*Dentindefekte* etc.), die die Milchmolaren in der Regel bald der Karies opfern. Dadurch fällt der ganze Kau- und Bissdruck auf die Milchfrontzähne, der Oberkiefer wird vertikal abgebogen, die Bißhöhe wird ganz niedrig und hebt sich erst wieder mit dem Durchbruch der bleibenden Molaren; aber dann ist das

Unheil schon geschehen, das Frontzahngeliet klafft, wir haben den offenen Biß.

Diese Genese, wie sie von Pfaff und Kantorowicz vertreten wird, habe ich in allen Phasen an Kindern bestätigt gefunden und ich kann dem Ausdrucke der genannten Forscher, daß es sich beim offenen Biß um eine „echte Belastungsdeformität“ handelt, nur beipflichten. Jedenfalls scheint mir der von Misch angegebene Grund, daß der Zungendruck den weichen Kiefer deformiere, nur untergeordnete Bedeutung zu haben.

Sehr oft sehen wir bei rachitischen Kiefern auch eine mehr oder minder klar ausgeprägte Prognathie und das um so mehr, als diese Erkrankung sehr oft mit einer für uns Zahnärzte sehr wichtigen Erscheinung vergesellschaftet ist, nämlich mit der Mundatmung bei Kindern.

Diese Erscheinung tritt ein, sobald der natürliche Luftzuweg durch die Nase infolge abnormer Wucherungen der Tonsillen oder der Rachenmandeln (adenoide Vegetation) gehemmt ist. Diese Hemmung kann sich durch Verschluss der Choanen zur gänzlichen Aufhebung der Nasenatmung steigern.

Derartige Kinder zeigen schon äußerlich typische Symptome, halboffener Mund, blödes, schläfriges Aussehen etc.

Schwere Veränderungen der Kieferknochen sind die Folge dieses verkehrten Luftstromes. Während bei der Rachitis hauptsächlich der Unterkiefer deformiert wird, finden wir bei der Mundatmung die charakteristische Veränderung des Oberkiefers, der seine elliptische Gestalt verliert, länger wird, vorn in der Mitte eingeknickt ist (fogen. gotischer Bogen). Aber auch das Gaumengewölbe hebt sich spitz zu solcher architektonischen Form. Mit dieser Kompression und Protrusion des Oberkiefers und Distalverlagerung des Unterkiefers sind die Hauptcharakteristika für die Prognathie gegeben, die tatsächlich sehr häufig klinisch mit der Mundatmung zusammentreffen.

Ich hatte einmal Gelegenheit, zwei Kinder (Geschwister) im Alter von 7 und 9 Jahren zu beobachten. Bei diesen war die Nasenatmung vollkommen unmöglich und zwar war schon äußerlich die

Verengung der Choanen sichtbar. Die Kinder ließen den Unterkiefer lässig herabhängen, um nur genügend Luft zu bekommen.

Der Unterkiefer war nicht wie sonst, ähnlich einer Progenie vorgestreckt, sondern lag fast der Brust auf. Sagte man ihnen jedoch, den Mund zu schließen, so zeigte sich eine Progenie. Die Kinder machten dadurch einen kretinenhaften Eindruck, zudem noch der Speichel über die Lippen lief. Auch ihre geistigen Fähigkeiten waren gering. Leider war es mir wegen der übergroßen Schreckhaftigkeit der Kinder unmöglich, Abdrücke oder Photographien zu machen.

Ueber die Ursache dieser bei vorhandener Mundatmung eintretenden Bißanomalien gehen die Ansichten sehr auseinander. Euler nimmt als Hauptursache an: Der bei stets halbgeöffnetem Mund immer überwiegende Wangendruck komprimiert den Oberkiefer. Diesem Druck weicht der Zahnbogen in der Richtung des geringsten Widerstandes — also nach vorne — gegen die Schneidezähne aus.

Die Luftdruckverhältnisse sind geändert. Der bei normaler Nasenatmung positive Druck in der Nasenhöhle verschwindet zu Gunsten eines erhöhten positiven Druckes in der Mundhöhle, der für den hohen gotischen Gaumen verantwortlich sei.

Dem gegenüber stellt Kantorowicz seine ätiologische Theorie auf vollkommen andere Basis und sagt: „Nicht die Mundatmung bewirkt die Kieferdeformation und damit die Bißanomalie, sondern die erschwerte Nasenatmung“. Den Beweis führt er damit, daß Kinder mit angeborenem Choanenverschluß, die also ausschließliche Mundatmer sind, keinerlei Kompression des Oberkiefers haben.

Also, folgert er, müßten bei der Mundatmung die gleichen normalen Luftdruckverhältnisse bestehen, wie bei der Nasenatmung. Hingegen muß zur Ueberwindung des Hindernisses im Nasen-Rachenraum während der Inspiration ein erhöhter negativer Druck aufgewandt werden, der bei jeder Inspirationsphase die Weichteile dem Kieferknochen anpreßt. Hiedurch entsteht die Komprimierung mit ihren sekundären Folgen. Man muß gestehen, daß diese Beweisführung von zwingender Logik ist.

Wenn wir uns nun der großen Gruppe der auf Grund mechanischer Einwirkung entstandenen Bißanomalien zuwenden, so betreten wir ein Gebiet mit zwar oft klarer erkennbarer Ätiologie, aber mit einer noch verworrenen Fülle von Formen.

Hiebei können die unmittelbar auf die Kiefer einwirkenden Kräfte entweder rein traumatischen oder pathologischen Ursprungs sein.

Ohne weiteres denken wir bei den Kiefertraumen in erster Linie an die mannigfachen Kriegskieferverletzungen, aber auch der moderne Sport liefert hier reichliche Beisteuer. In den meisten Fällen haben wir es mit Frakturen zu tun, die zwar, wenn sie nicht zu schwer und rite ausgeheilt sind, keine Bißverschiebungen hinterlassen. Desto gründlicher und in allen Formen unserer Systematik sehen wir sie aber auftreten, wo durch schwere Traumen (Granatplitter etc.) ganze Kieferteile zerstört wurden und die Behandlung durch die Kriegsverhältnisse beeinträchtigt war,

Zu den pathologischen Ursachen haben wir zunächst alle Arten von mächtigen Halsnarben zu rechnen, die je nach ihrer Lage einen so starken Dauerzug auf den unteren Alveolarfortsatz ausüben können, daß die verschiedenartigsten Bißanomalien auftreten, die in ihrer Form jedem System spotten. So kann der Alveolarfortsatz in der Gegend der unteren Schneidezähne samt den Zähnen nach auswärts gekehrt sein, oder sogar der Unterkieferkörper in seinem vorderen Teil nach abwärts gebogen sein.

Daß Tumoren aller Art durch Druck oder Zug Kiefer- und Bißanomalien erzeugen können, ist selbstverständlich.

Die durch Makroglossie unmäßig vergrößerte Zunge drückt die untere Zahnfront, oft sogar die Mahlzähne nach auswärts und zwar mit so enormer Kraft, daß selbst der Alveolarfortsatz und der Kieferkörper geknickt wird.

Wir sehen auch bei Makrocheilie, wie die unförmige Unterlippe den ganzen Unterkiefer spitzt, auszieht und verlängert.

Unter den vielen Tumoren der Kiefer selbst seien hauptsächlich die Cysten erwähnt, die oft in mächtiger Größe die ganze Figuration des Gaumens und der Kiefer verändern können.

Finden wir bei all diesen Einwirkungen, wie erwähnt, ganz irreguläre, launenhafte Formen der Bißanomalien vor, so bewegen sich die durch üble Angewohnheit erworbenen in mehr gesetzmäßigen Formen.

Denken wir hiebei z. B. an den mechanischen Insult durch den Schnuller oder den Daumen. Die Luft am Saugen selbst erklärt Angle als Zeichen nervöser Schwäche, Freud als unbewußte autoerotische Betätigung an der erogenen Mundzone. Wie dem auch sei, wir haben es jedenfalls mit einer gewaltsamenstellungsänderung des Alveolarfortsatzes zu tun, die durch Ausbiegung des Oberkiefers zur Prognathie oder zum offenen Biß führen kann.

Hiezu möchte ich zwei Fälle aus meiner Praxis anführen:

Im ersten Fall ist die Patientin 22 Jahre alt und empfindet die Entstellung sehr stark. Die oberen Schneidezähne stehen sehr weit vor und auf der Unterlippe auf. Die Oberlippe wird durch den verlängerten Zahnbogen sehr gespannt und gegen die Nase zurückgezogen. Die Patientin ist kerngesund, keine Krankheiten, die diese Veränderung hätten bedingen können, sind in der Anamnese zu finden. Aber eine wichtige Tatsache gibt sie an, nämlich




Abbildung 3.

bis zum sechsten Jahre, also erst durch den Schulbesuch abgewöhnt, immer an Schnuller oder Daumen gesaugt zu haben. Die oberen



Abbildung 4.

Schneidezähne bzw. der Alveolarfortsatz sind durch ständigen Druck nach vorn gedrückt worden, der Zahnbogen sehr weit



Abbildung 5

mesio-lagittal über die unteren Schneidezähne vorverlegt worden. Ihre Geschwister, die alle spät nach ihr geboren wurden, bei denen man, durch die schlechten Erfahrungen gewitzigt, die Unart des Schnullens bekämpfte, besitzen diese Anomalie nicht.

Der zweite Fall zeigt noch eine krassere, verheerende Wirkung dieser üblen Angewohnheit. Es handelt sich um ein neunjähriges



Abbildung 6.

Mädchen, dessen Eltern und Geschwister normale Bißverhältnisse



Abbildung 7.

befitzen. Die Anomalie ist durch langes Lutschen entstanden, wie



Abbildung 8.




Abbildung 9.

die Eltern selbst angeben. Und zwar muß diese Veränderung und Schiefstellung der Zähne erst in späteren Jahren erfolgt sein, denn das Kind selbst kann sich noch erinnern, „schöne Zähne“ gehabt

zu haben. Bemerkenswert ist noch der tiefe Biß, den ich noch weiter unten bei den Wirkungen der vorzeitigen Extraktionen erwähnen werde.

Aber noch eine große Anzahl anderer deformierender Unarten können die normalen Bißverhältnisse dauernd zerstören, so das Einfaugen der Wange zwischen Molaren, das Zungepressen gegen bestimmte Zahngruppen. Die Wirkung dieser Kräfte auf den Kiefer in eben gesagter Art zeigen folgende zwei Fälle:

Der erste Fall zeigt einen Mann von 24 Jahren, der als Kind die Angewohnheit hatte, seine Wange zwischen obere und untere Zahnreihe einzuziehen, und zwar nur in der Molarengegend. Die




Abbildung 10.

unverkennbaren Folgen hiervon zeigt Abbildung 10.

Der zweite Fall ist ebenfalls ein junger Mann von 20 Jahren, der in seiner Kindheit, besonders zur Zeit der zweiten Dentition seine Zunge gewohnheitsmäßig auf der rechten Seite zum Mundwinkel herausstreckte und gegen die Zähne wurzelwärts drückte. Dies war zweifellos die Ursache zu dem teilweise offenen Biß, den er heute auf der rechten Seite hat, wie Abbildung 11 zeigt.



Abbildung 11.

Daß alle diese bei Kindern so häufigen Unarten nicht noch viel größere Verheerungen in den Bißverhältnissen anrichten, ist nach Kontorowicz dem Umstande zuzuschreiben, daß eben nur durch gewisse Knochenweichheit schon geschwächte Kiefer diesen Insulten zum Opfer fallen.

Schließlich hat noch Angle und Case nachgewiesen, daß gewisse anormale Lage während des Schlafes Bißveränderungen erzeugen können, so das Schlafen auf einer Hand oder einem Arm, wodurch bei einseitiger Lage Kreuzbiß, bei doppelseitiger Kompression mit allen Begleiterscheinungen erzeugt werden können. Die Möglichkeit dieser schädigenden Druckwirkung ist jedenfalls nicht zu bestreiten.

Einen typischen Fall von einseitiger Druckwirkung auf den Kiefer während des Schlafes, die auch tagsüber durch schlechte Angewohnheit nicht listiert, kann ich hier mit Bildern belegen. Besagter Patient ist 18 Jahre alt, von gesunder Natur. In der Anamnese ist Rachitis oder ähnliche Erkrankungen, die eine Wirkung in dieser Hinsicht haben, nicht zu finden. Dieser Patient liegt seit seiner frühesten Kindheit während des Schlafes auf der rechten Seite und legt die betreffende Gesichtshälfte immer auf den Arm. Dieser ständige Druck allein würde schon genügen, den rechten



Abbildung 12 und 13.

Gefichtschädel zu verändern. Nun hat dieser junge Mann noch folgende üble Angewohnheit: Den ganzen Tag, wenn nur irgend möglich, stützt er gleich Abb. 12 sein Gesicht in die Hand. Wenn man Abb. 13 betrachtet, so kann man äußerlich schon die Wirkung dieses Druckes erkennen. Die Nasenlinie fällt nicht mit der der Stirn zusammen, sondern steht im spitzen Winkel zu derselben. Unterfucht man nun die Wirkung dieses Druckes auf Kiefer und Zähne, so muß man staunen, welche Verheerung im Gebiß entstanden ist. Der rechte Alveolarkörper ist vollkommen eingedrückt, die Zähne mußten also dem ständigen Druck nachgeben. Die Veränderung fängt genau in der Mittellinie an und zieht sich über die ganze rechte Kieferhälfte hin. Der Kiefer wurde am Seitenwachstum stark behindert, ja vielleicht sogar eingedrückt, die Folge davon ist nun ein rechtsseitiger Kreuzbiß, wie Abb. 14 zeigt. Ja selbst der rechte Nasengang ist durch den ständigen Druck vollkommen unentwickelt und ganz verschlossen, so daß die Gesamtatmung stark behindert ist.

Die letzte große Ursachengruppe der Bißverschiebungen liegt im Werden und Vergehen des Zahnsystems selbst. Im Werden kann ohne Zweifel schon der abnorme Durchbruch der Milch- und bleibenden Zähne bestimmend auf den Biß einwirken

Einen großen Einfluß auf den Durchbruch der Milch-, sowie bleibenden Zähne hat zweifellos auch die Rachitis, die ihn häufig




Abbildung 14.

verzögert. Ja selbst das Fehlen der einzelnen Zähne, manchmal sogar Zahngruppen ist darauf zurückzuführen. Von ganz besonderer Bedeutung für die Durchbruchzeiten der Zähne ist das frühere oder spätere Auftreten der Rachitis. Tritt die Rachitis in ganz früher Kindheit auf, so ist von vornherein der Durchbruch der Zähne verzögert. Floriert sie aber erst später, so können die zuerst durchbrechenden Zähne auch zur rechten Zeit erscheinen, der Durchbruch der noch ausstehenden wird aber verzögert. Ueber die Durchbruchsnorm darf man nicht zu engherzig denken, eine Differenz von einigen Monaten spielt keine Rolle; es sind also nicht gleich alle verspäteten Durchbrüche auf Rachitis zurückzuführen. Die Ursache für die durch Rachitis hervorgerufenen Anomalien ist in der gestörten Verkalkung und demzufolge auch im langsameren Wachstum der Knochen und besonders der Zähne zu suchen.

Einen vielleicht typischen Fall dazu: Ein Paar Zwillinge, wohl eineiige, zeigen beide äußerst rachitische Merkmale, sie leiden beide an Skoliose. Von Jugend auf zurückgeblieben und schwächlich, wiegen sie doch mit 27 Jahren nur 68 Pfund mit Stützkorsett. Wie groß der Kalkhunger war, beweist, daß sie als kleine Kinder den Kalk von den Wänden kratzten und zu sich nahmen. Die




Abbildung 15.

uns besonders interessierenden Merkmale sind diese: 1. Tiefer Biß, so daß die oberen Schneidezähne die unteren ganz verdecken, letztere aber ganz gewaltig in den Oberkiefer beißen. Die Ursache für diesen tiefen Biß ist wohl darin zu suchen, daß die Milchmolaren durch Karies verloren gegangen sind. Der ganze Biß lastete auf den vorderen Schneidezähnen. Da sich nun die bleibenden Molaren erst später einstellten, die zweiten erst mit 23 bis 25 Jahren, so konnte sich der tiefe Biß fixieren. Daraus kann man ersehen, daß der späte Durchbruch, durch Rachitis bedingt, Anomalien erzeugt. 2. Rachitisch veränderte Kiefer, der untere eckig, der obere komprimiert in der Form.

Von weitaus entscheidenderem Einfluß auf eine große Anzahl von Bißanomalien ist sicher die Extraktion auf das in der Entwicklung befindliche Gebiß. Wir müssen uns hiebei erinnern, daß die Gestalt des Kiefers — wenn sie auch unter Einwirkung der normalen Formungskraft jeden Organes steht — doch hauptsächlich vom Wachstum und Durchbruch der Zähne bestimmt wird. Der jeweils zum Durchbruch kommende Zahn muß ohne Zweifel den Kiefer zum entsprechenden Wachstum anreizen, um sich so seinen Platz zu erkämpfen.

Stellen wir uns nun vor, daß vor einem durchbrechenden Zahn eine Extraktionslücke entstanden ist, so beschlagnahmt er natürlich den Platz dieser Lücke. Der Platz, den er erkämpfen sollte, wird ihm also geschenkt; aber auch das Kieferwachstum unterbleibt. Ein Umstand, der sich fast gesetzmäßig bei Extraktion der zweiten Milchmolaren vor dem Durchbruch der ersten bleibenden rächt. Diese wichtigen Zähne, die Stützpfeiler des bleibenden Gebisses, brechen dann zu weit vorn durch, gewissermaßen ohne Raumfalsberechtigung. Die den Milchmolaren folgenden Prämolaren kommen daraufhin so stark ins Gedränge, daß die Grundlage für eine Bißverschiebung gegeben ist.

Kantorowicz geht noch weiter und behauptet, daß, wenn der jeweils letzte Zahn einer Seite extrahiert und somit hier das Kieferwachstum sistiert wird, der Druck dieses Wachstums auf der gesunden Seite dann eine Verschiebung der Mittellinie bedinge.

Bei der Besprechung über Daumenlutschen erwähnte ich einen Fall (Abb. 6—9), zu dem ich im folgenden kurz noch einmal spreche. Der tiefe Biß bei diesem Kind ist nur auf frühzeitige Extraktion zurückzuführen, denn betrachtet man Abb. 7, so sieht man, wie der zweite obere Milchmolar tief in die Lücke des unteren zweiten beißt. Da auch noch weitere frühzeitige Extraktionen der Milchmolaren vorgenommen sind, so war auf keinen Fall der Biß bzw. die Bißhöhe gefestigt. Wie nun die ersten bleibenden Molaren durchbrachen, war der tiefe Biß schon vorhanden. Somit konnten also diese Zähne nicht ganz, als Folge davon, in ihrer ganzen Größe erscheinen.

Wir haben ferner bei Besprechung des offenen Bisses bereits gesehen, daß dieser durch Verlust der hypoplastischen Milchmolaren (Karies) verursacht werden kann, indem der rachitisch weiche Oberkiefer unter dem Kaudruck nachgibt. Die gleichen Verhältnisse können selbstverständlich nach Extraktion dieser Milchmolaren auch eintreten. Freilich ist hier die Hauptursache in dem weichen, rachitischen Knochen zu suchen.

Unter normalen Verhältnissen würde die frühzeitige Extraktion der stützenden Milchmolaren, wie bereits schon oben erwähnt, zu einer Senkung des Bisses — zum tiefen Biß — führen, der durch frühen Verluſt der bleibenden Prämolaren in die häßliche fächerförmig gelpreizte Stellung der Frontzähne übergehen kann.

Zwei wohl ganz typiſche Fälle mit Bildern beweifen eben Gefagtes. In beiden iſt die Wirkung auf die Frontzähne die gleiche, ebenſo die Stellung. Im Fall 1 (Abb. 16 und 16a) iſt die Urſache nur in Karies, in Fall 2 (Abb. 17 bis 17 b) in Karies und frühzeitiger Extraktion der Milchmolaren und bleibenden zu ſuchen, da andere Urſachen nicht in Frage kommen können. Durch den Verluſt der bleibenden bezw. Milchmolaren ſank rückwärts der Biß, die Frontzähne wurden, da kein Zahnerſatz getragen wurde, überlaſtet und aus ihrer Stellung gedrängt. Die Folge davon war ihre Fächerung.



Abbildung 16.




Abbildung 16a.



Abbildung 17.

Einen Fall aus der Literatur will ich noch anführen, den Elle Levy-Davidson (Hamburg) in Z. zahnärztliche Orthopädie XX Nr. 3 publizierte, wo einem 15¹/₂-jährigen Patienten die beiden




Abbildung 17a.



Abbildung 17b.

oberen außerhalb der Reihe durchgebrochenen Eckzähne extrahiert wurden, da sie die Lippe vorwölbten. Während nun vor der Extraktion die oberen Schneidezähne vor die unteren gebissen hatten, bildete sich innerhalb eines Jahres der konträre Zustand aus, der dem Patienten Beschwerden beim Essen bereitete und Entstellung hervorrief.

Ferner sei noch daran gedacht, daß bei der Extraktion die Keime der Zähne verletzt werden können, ja sogar entfernt, wodurch eine künstliche Unterzahl der Zähne hervorgerufen wird, worauf wohl manche Anomalien zurückgeführt werden können.

Meine Schlußworte sollen die Gedanken der Einleitung berühren. So groß auch heute die Erfolge bei der Behandlung der Bißanomalien sind, so wollen wir uns klar sein, daß sie meist — wie Simon sagt — auf „Zustandsdiagnosen“ begründet sind und daß die Erfolge nicht das Verdienst einer kausalen Therapie sind. In manchen Fällen ja wohl; oft ist ja, wenn uns die Natur in zwingender Deutlichkeit Ursache und Wirkung erkennen läßt, „der Geist der Medizin leicht zu fassen.“ In den weitaus meisten Fällen aber stoßen wir auf ein so kompliziertes Ursachengeflecht, daß von einer kausalen Therapie kaum mehr die Rede sein kann.

Und doch muß diese das Ziel der Forschung sein. Es kann vielleicht erreicht werden, wenn sich auch der Praktiker nicht mehr mit dem Status begnügt, sondern bestrebt ist, das Bild jeder einzelnen Krankheitsgeschichte so weit wie möglich kausal auszubauen. Freilich wird es ein mühsamer Bau sein, zu dem oft kleine Steinchen von weit herbeigetragen werden müssen. Aber durch unermüdliches Nachspüren nach den Kieferbildern der Vorfahren, nach dem Zustand des Milchgebisses, stattgefundenen Extraktionen, überstandenen Krankheiten, nachgewiesenen Angewohnheiten etc., so wird doch in manchen Fällen der Schleier, wenn auch nur teilweise, gelüftet werden.

Eine Unzahl von derartigen, unter die Lupe genommenen Einzelfällen wird aber ungeahnte Brücken schlagen und kausale Zusammenhänge offenbaren, die uns heute manchmal noch unmöglich scheinen. Dann wird auch die Therapie kühn und folgerichtig vorgehen können.

Causa remota cessit effectus!

Literaturverzeichnis.

- 1.) Ätiologie der Orthodontischen Anomalien. (Prof. Dr. Alfred Kantorowicz und Dr. Gustav Korkhaus, Bonn. Fortschritte der Zahnheilkunde 1925 Bd. I., Lieferung 3.)
- 2.) Innere Sekretion. (Prof. Dr. Peter Kranz, München. Fortschritte der Zahnheilkunde 1925 Bd. I, Lieferung 5.)
- 3.) Lehrbuch der Zahnheilkunde. (Port-Euler.)
- 4.) Inherited and congenital causitive factors in malocclusion. Frank M. C., Cleveland-Ohio. D. americ. dent. Assoc. XV Nr. 7.)
- 5.) Postural habits. (S. Albert Crosby, Newhaven. Dent. Rec. XLVIII Nr. 5.)
- 6.) Ueber die Extraktion von Eckzähnen und ihre Folgeerscheinungen. (Elfe Levy-Davidson, Hamburg. Z. zahnärztl. Orthop. XX Nr. 3.)
- 7.) Grenzgebiete der Zahnheilkunde und Medizin. (Julius Misch.)

Lebenslauf.

Am 2. August 1907 wurde ich als Sohn des Alfred Grunert, jetzt Reichsbahnobersekretär a. D., und seiner Ehefrau Martha, geb. Machnicka, in Rawicz i. Polen, ehem. Provinz Posen, geboren. April 1914 trat ich zu Bismardhütte i. O.-S. in die Volksschule ein. Im April 1918 ging ich in das humanistische Gymnasium über und besuchte die Anstalten — infolge der politischen Verhältnisse in Oberschlesien — in Nikolai, Lublinitz, Lauban, Lublinitz, Kreuzburg, Straubing und das Alte Humanistische Gymnasium in Regensburg, wo ich im April 1927 das Abitur bestand. Darauf immatrikulierte ich mich in München bei der Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität als Zahnheilkundestudierender. Nach drei Semestern, im vierten, bestand ich das zahnärztliche Physikum und nach sieben Semestern das zahnärztliche Staatsexamen. Nach meiner Approbation ließ ich mich als praktischer Zahnarzt in Markt Grafing, Bezirksamt Ebersberg, nieder, wo ich seit zwei Jahren meine Praxis ausübe. 1931 vermählte ich mich mit Fräulein Erika Biechele, Tochter des prakt. Zahnarztes und Majors a. D. Dr. Rudolf Biechele aus Regensburg. Unserer Ehe entsproß eine Tochter, namens Ilse.

Hellmuth Grunert.

